

JÄTTELOKA




Alla markägare ansvarar för att ta bort invasiva arter på sin mark

VID BEKÄMPNING AV JÄTTELOKA, TÄNK PÅ ATT:

- Jätteloka sprider sig med sina många tusentals frön, som dessutom kan bilda en långlivad fröbank i marken.
- Bekämpa vid rätt tidpunkt, då bekämpning av större bestånd med slätter sker säkrast och mest effektivt under blomningstid och före frösättning. Bekämpning av små bestånd, med uppgrävning och rotkapning görs lättast tidigt på säsongen när plantorna är små.
- Bära skyddskläder, vattenavvisande handskar, samt skyddsglasögon eller visir, så ingen fototoxisk växtsaft kommer på hud eller ögon. Ha med en ögonduch vid bekämpningen för säkerhets skull. Tvätta snabbt huden med tvål och vatten om det skulle komma växtsaft på den, och undvik solljus ett par dagar framåt.
- Undvika att använda trimmer eller liknande redskap med roterande klingor som kan göra att växtsaften stänker vid bekämpningen.
- Alltid först ta bort blom- och fröställningarna, eftersom växten sprids genom fröna. Sätt en plastpåse försiktigt över blom- och fröställningarna innan växten bekämpas, så inte den stora mängden frön faller till marken. Lämna inte blom- och fröställningar på platsen, de ska förslutas väl i dubbla sopsäckar och transporteras till särskild container för invasiva arter på ÄVC:n för förbränning, inte läggas bland växtavfall.
- Rengöra använda redskap från växtsaft och växtdelar eftersom även torkad växtsaft är giftig. För att undvika spridning av frön är det viktigt att utöver rengöring av redskap även rengöra skosulor och maskiner. Vid rengöringen är det viktigt att vattnet inte rinner någonstans där det kan leda till att växten nyetableras.
- Följ upp platsen under 7-10 år eftersom frön i fröbanken kan gro efter lång tid.

Jättelokan hotar den biologiska mångfalden genom att den breder ut sig mycket snabbt och bildar stora, täta bestånd som skuggar ut övriga arter på platsen. Jätteloka utgör även en fara för människors och djurs hälsa.



JÄTTELOKA

VID BEKÄMPNING AV JÄTTELOKA, TÄNK PÅ ATT:

Vid bekämpning av jätteloka är det effektivt att ta ner växten under blomningstid, för att undvika nödkott. Tas bara blommande individer ner, behövs endast en bekämpning per säsong. Alternativt görs slåtter tre gånger per säsong, med början före eller under blomning. Det är viktigt att bekämpa före frösättning, för att undvika spridning av frön.

- Under blomningstiden som är juni-augusti, har jättelokan vita blomställningar som kan bli upp till en halvmeter stora.
- Något senare börjar gröna frön bildas. Tas blom- eller fröställningarna bort vid den tidpunkten när plantan är i blom och börjar bilda gröna frön, dör plantan utan att sätta frö eller blomma igen.
- Vid den tidpunkt när plantans fröställningar har fått en brun färg, är plantan redo att sätta frö, och risken för spridning av frön är mycket stor.

Källor: Länsstyrelsen 2022, Naturvårdsverket 2023, Ängelholms kommun 2018, Falkenbergs kommun 2014.

